



UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI
COLLEGIUM MEDICUM

Smog, alergia i astma – czego nauczyły nas wieloletnie badania mieszkańców Krakowa?

Ewa Czarnobilska

Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum
Katedra Toksykologii i Chorób Środowiskowych. Zakład Alergologii Klinicznej i Środowiskowej,
Centrum Alergologii Klinicznej i Środowiskowej Szpitala Uniwersyteckiego
Kierownik: prof. dr hab. med. Ewa Czarnobilska



STATE OF GLOBAL AIR /2025

Według raportu Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) zatytułowanego State of Global Air w 2025: ponad 90% ludzi żyje w obszarach o niezdrowym powietrzu



STATE OF GLOBAL AIR /2025


Air pollution continues to be the second leading risk factor for early death, surpassed only by high blood pressure.

7.9 million

deaths attributed to air pollution in 2023,



about **1 in 8** deaths worldwide.



Of this total, **4.9 million deaths** were attributable to ambient PM_{2.5} exposure,

2.8 million were from household air pollution, and

470,000 were from ozone.

Noncommunicable diseases accounted for **6.8 million deaths**.



86%

of global deaths were attributable to air pollution in 2023.



1 in 2 chronic obstructive pulmonary disease (COPD) deaths



More than **1 in 4** dementia deaths



1 in 4 heart disease deaths



Nearly **1 in 6** diabetes deaths

Zanieczyszczenie powietrza,
to 2 po nadciśnieniu tętniczym
przyczyna zgonów na świecie



Z powodu przewlekłych chorób
obturacyjnych płuc, demencji,
choroby niedokrwiennej serca, cukrzycy.

Astma: rozwój choroby i zaostrzenia

**Najsilniej potwierdzony klinicznie efekt: krótkoterminowy wzrost $PM_{2.5}$, PM_{10} i NO_2
→ więcej wizyt SOR i hospitalizacji z powodu astmy.**

$PM_{2.5}$ / PM_{10}

zaostrzenia, objawy, spadek kontroli

dowód: przeglądy systematyczne / wytyczne EAACI

NO_2 / ruch uliczny

dzieci: ryzyko incydentnej astmy i wizyt ambulatoryjnych

dowód: przeglądy systematyczne / wytyczne EAACI

O_3 / upał

oksydacja, kaszel, skurcz oskrzeli; efekt modyfikowany temperaturą

dowód: przeglądy systematyczne / wytyczne EAACI

Efekt nie kończy się na objawach: ekspozycje we wczesnym życiu mogą wpływać na tor rozwoju płuc i podatność immunologiczną.



Kto jest najbardziej podatny?

Ryzyko rośnie, gdy ekspozycja nakłada się na podatność biologiczną i społeczną.

1

dzieci

rozwijające się płuca, większa wentylacja minutowa/kg, aktywność na zewnątrz

2

osoby starsze

mniejsza rezerwa oddechowa, wielochorobowość

3

POChP / astma ciężka

wyższe ryzyko zaostrzeń i hospitalizacji

4

palacze i byli palacze

synergia dymu tytoniowego i PM_{2.5}

5

niski SES / bliskość dróg

większa ekspozycja, mniej zasobów ochronnych

6

kobiety i niepalący z POChP

w nowszych analizach mieszanki pollutantów wykazują silniejszy efekt w części podgrup




Wpływ wczesnej ekspozycji na zanieczyszczenie powietrza związane z ruchem drogowym (TRAP - traffic-related air pollution)

- Wysoka ekspozycja na TRAP po urodzeniu dziecka wiąże się ze zwiększonym ryzykiem przejściowego lub trwałego świszczącego oddechu.
- Natomiast dzieci z wysokim poziomem narażenia na TRAP w sposób ciągły od urodzenia do siedmiu lat miały istotnie zwiększone ryzyko astmy (aOR = 1,71, 95% CI 1,01 - 2,88).
- **Narażenie na TRAP** jest związane z **nowo powstałą astmą** i może mieć trwały efekt z czasem opóźnienia wynoszącym około 3 lata.



Ekspozycja na zanieczyszczenia już w okresie przed poczęciem może wpływać na choroby alergiczne w późniejszym okresie życia



Zwiększone ryzyko chorób atopowych wieku dziecięcego, głównie astmy, alergicznego nieżytu nosa i wyprysku alergicznego, w przypadku narażenia na zanieczyszczenia w okresie okołoporodowym.

Narastający problem chorób alergicznych u dzieci i młodzieży szkolnej - program profilaktyczny dla uczniów z krakowskich szkół

Miejski Program profilaktyki astmy i chorób alergicznych u dzieci i młodzieży szkolnej w Krakowie

Program realizowany od 2007 roku do 2018

Koordynator / autor: prof. UJ, dr hab. med. Ewa Czarnobilska

W latach 2007–2018 w Krakowie przeprowadzono badanie ankietowe, którym na pierwszym etapie objęto dzieci w wieku **7–8 lat** i młodzież w wieku **16–17 lat**. Łączna liczba respondentów wyniosła **75 000**.

Według badań **ECAP 2006–2008** (Epidemiologia Chorób Alergicznych w Polsce)
alergia występuje już u 40% Polaków.

Ponad **50%** respondentów zgłaszało **objawy alergiczne**,

60% z nich nie miało ustalonego rozpoznania

i **nie było leczonych** z tego powodu.




Residential proximity to major roadways is associated with increased prevalence of allergic respiratory symptoms in children

Grzegorz Porebski¹, Magdalena Woźniak¹, Ewa Czarnobilska¹

¹ Department of Clinical and Environmental Allergology, Jagiellonian University Medical College, Krakow, Poland

Zależność między częstością występowania objawów **alergicznego nieżytu nosa** od odległości od drogi dla trzech opisywanych grup:

<200m,
200-500m,
>500m.




Residential proximity to major roadways is associated with increased prevalence of allergic respiratory symptoms in children

Grzegorz Porebski¹, Magdalena Woźniak¹, Ewa Czarnobilska¹

¹ Department of Clinical and Environmental Allergology, Jagiellonian University Medical College, Krakow, Poland

Zależność między częstością występowania objawów **astmy oskrzelowej** od odległości od drogi dla trzech opisywanych grup:

<200m,
200-500m,
>500m.





Article


Trends in the Epidemiology of Allergic Diseases of the Airways in Children Growing Up in an Urban Agglomeration

Marcel Mazur ¹, Maria Czarnobilska ², Wojciech Dyga ¹ and Ewa Czarnobilska ^{1,*}

Przeanalizowaliśmy zachorowalność na astmę i alergiczny nieżyt nosa w latach 2014-2018 u **30 000 dzieci z alergią** w wieku 7-8 lat i młodzieży w wieku 16-17 lat.

W grupie 7-8-latków z alergią, 52% miało **alergiczny nieżyt nosa**, a 9,1% astmę.



W grupie 16-17-latków **alergiczny nieżyt nosa** rozpoznano w 35,8%, a astmę w 4,9% przypadków.



Na przestrzeni 10 lat pomiędzy 2008 a 2018 krakowskie badania wykazały zmniejszenie częstości występowania:

- **alergicznego nieżytu nosa** z **63,9%** do **35,8%** u młodzieży,

- **astmy** z **22%** w obu grupach wiekowych do **9,1%** u młodzieży i **4,9%** u dzieci.




2x ↓ astmy u dzieci

4x ↓ astmy u młodzieży



Można to uznać za pozytywny efekt działań profilaktycznych podjętych w Krakowie po 2010 roku.



Poprawa jakości powietrza w Krakowie i Małopolsce szczególnie widoczna jest w okresie grzewczym od października do marca. Średnie stężenie pyłu PM10, PM2.5 między sezonem zimowym 2014-2015 a sezonem 2023-2024 spadło w Małopolsce o 51%, w tym w Krakowie aż o 57%, a poza Krakowem o 49%.

Średnie stężenie pyłu PM10, PM2.5 ↓ 2x



Article

The Influence of Air Pollution on the Development of Allergic Inflammation in the Airways in Krakow's Atopic and Non-Atopic Residents


Ewa Czarnobilska ¹, Małgorzata Bulanda ¹, Daniel Bulanda ² and Marcel Mazur ^{1,*}

Published: 28 May 2021

BAT z pyłem PM_{2,5} i brzozą

80% Pacjentów z objawami ANN i/lub AO w okresie grzewczym i z wykluczoną alergią na alergenów całorocznych miało dodatni BAT z PM_{2,5}



Wpływ zanieczyszczeń powietrza na aktywność bazofilów u mieszkańców Krakowa



I sezon grzewczy, dgn Alergiczny nieżyt nosa.

Pacjent lat 32 – cytologia nosa

- Materiał kom. zapalnych skąpy, jednak z podwyższoną obecnością **eozynofilów (12%)**



Pacjent lat 32 – TK zatok

Polipowate zgrubienia śluzówki w obu **zatokach szczękowych** zajmujące głównie dolne części tych zatok, do grubości 37 mm - po prawej i do grubości 24 mm - po lewej. **Ujścia tych zatok niedrożne**. Niewielkie okrężne zgrubienie śluzówki do 2 mm w zachyłku czołowym lewej **zatoki czołowej, ujście tej zatoki niedrożne**. Prawa zatoka czołowa i zatoki klinowe prawidłowo powietrzne. **Ujścia zatok klinowych niedrożne**, ujście prawej zatoki czołowej drożne. Obustronnie **w sitowiu** widoczne **polipowate i okrężne zgrubienia śluzówki** powodujące bezpowietrność części komórek. **Zachyłki klinowo-sitowe niedrożne**. Ograniczenia kostne zatok prawidłowe.



Pacjent lat 32

Indeks jakości powietrza	PM10 [µg/m ³]	PM2,5 [µg/m ³]	O ₃ [µg/m ³]	NO ₂ [µg/m ³]	SO ₂ [µg/m ³]	C ₆ H ₆ [µg/m ³]	CO [mg/m ³]
Bardzo dobry	0 - 20	0 - 12	0 - 30	0 - 40	0 - 50	0 - 5	0 - 2
Dobry	21 - 60	13 - 36	31 - 70	41 - 100	51 - 100	6 - 10	3 - 6
Umiarkowany	61 - 100	37 - 60	71 - 120	101 - 150	101 - 200	11 - 15	7 - 10
Dostateczny	101 - 140	61 - 84	121 - 160	151 - 200	201 - 350	16 - 20	11 - 14
Zły	141 - 200	85 - 120	161 - 240	201 - 400	351 - 500	21 - 50	15 - 20
Bardzo zły	> 200	> 120	> 240	> 400	> 500	> 50	> 20

- 2.02.2021
- Pacjent zgłosił się w trybie pilnym z powodu **kaszlu nasilającego się wieczorem oraz duszności** od 2 tyg. bez cech infekcji.
- W badaniu fizykalnym nad polami płucnymi pojedyncze świsty wydechowe
- W wykonanej spirometrii **FEV1 76%** wartości należnej, **próba rozkurczowa dodatnia (wzrost o 13%)**.



Mechanizmy: od cząstki (PM2.5) do obturacji

Trzy węzły patogenetyczne

1

Uszkodzenie bariery nabłonkowej

wzrost przepuszczalności, cytokiny alarminowe, ułatwione wnikanie alergenów i infekcji

2

Stres oksydacyjny i zapalenie

ROS, NF- κ B/AP-1, Th2/Th17, neutrofile, eozynofile, mikrobiom

3

Przebudowa i utrwalona obturacja

śluz, hipertrofia mięśniówki, zwłóknienie małych dróg oddechowych, rozedma



Szczególnie ważne w POChP: PM_{2.5} może nasilać uszkodzenie indukowane dymem tytoniowym przez szlak NLRP3/kaspaza-1 i pyroptozę.


Depozycja PM w drogach oddechowych w zależności od wielkości cząstek



CZĘŚĆ II

Rozdział 1. Smog a choroby cywilizacyjne – Ewa Czarnobilska, Małgorzata Bulanda

Rozdział 2. Zanieczyszczenia powietrza a choroby układu oddechowego
– Ewa Czarnobilska, Małgorzata Bulanda




WHO w dn. 22 września **2021** opublikowała **aktualizację rekomendacji** dot. jakości powietrza dla sześciu rodzajów zanieczyszczeń: pyłu PM_{2.5}, pyłu PM₁₀, dwutlenku azotu, dwutlenku siarki, ozonu oraz tlenku węgla.

W październiku **2022** r. **Komisja UE** przedstawiła wniosek dotyczący aktualizacji i połączenia istniejących dyrektyw w sprawie jakości **powietrza**

Proponowana nowa dyrektywa **ustanawia bardziej rygorystyczne normy jakości powietrza na 2030 r.**, co będzie jednym z pośrednich kroków na drodze do zerowego poziomu emisji zanieczyszczeń do 2050 r.


W przypadku pyłu drobnego (**PM_{2,5}**), który jest przyczyną największej liczby **przedwczesnych zgonów w Europie**, roczna wartość dopuszczalna zostanie obniżona z 25 µg/m³ **do 10 µg/m³** (zgodnie z wytycznymi **WHO – 5 µg/m³**).



Micrograms of PM2.5 per cubic metre (2000-19 avg)

0 5 7.5 10 12 14 16 19+ No data

WHO safe air recommendation



Guardian graphic. Source: Expanse project; Guardian analysis

Polska w czołówce najbardziej zanieczyszczonych państw Europy

Dziennik "The Guardian" we współpracy z naukowcami z Holandii i Szwajcarii opracował interaktywną mapę przedstawiającą najbardziej zanieczyszczone obszary w Europie.

Dane zebrano przy użyciu zdjęć satelitarnych i pomiarów z ponad 1,4 tys. naziemnych stacji monitorujących.

Mieszkańcy Polski, Serbii, Rumunii, Albanii, Macedonii Północnej, Słowacji, Węgier oraz północnych Włoch oddychają powietrzem, w którym poziom pyłu PM 2.5 dwukrotnie przekracza wytyczne WHO. Najlepiej w tym zestawieniu wypadła Szwecja.



Influence of Environmental Pollution on Basophil Reactivity to Birch Pollen Allergens in Atopic and Non-Atopic Subjects

Maria Czarnobilska¹ | Małgorzata Bułanda² | Ewa Czarnobilska² | Wojciech Dyga² | Marek Jutel^{3,4} | Dorota Myszewska²

¹Doctoral School of Medical and Health Sciences, Jagiellonian University Medical College, Kraków, Małopolska, Poland | ²Department of Clinical and Environmental Allergy, Jagiellonian University Medical College, Kraków, Małopolska, Poland | ³Department of Clinical Immunology, Faculty of Medicine, Wrocław Medical University, Wrocław, Poland | ⁴ALL-MED Medical Research Institute, Wrocław, Poland

Pyłek brzozy w zanieczyszczonym środowisku powoduje objawy astmy u osób uczulonych

- Wykazano istotne dodatnie korelacje między nasileniem objawów astmatycznych a stężeniem zarówno pyłku brzozy, jak i pyłu zawieszonego (PM 2.5, PM 10) ($p < 0,05$).



Pyłek brzozy w zanieczyszczonym powietrzu jest bardziej agresywny (wzrost stężenia Bet v1)

Environmental Science and Pollution Research (2021) 28:39952–39965
<https://doi.org/10.1007/s11356-021-13483-8>

RESEARCH ARTICLE

Changes in qualitative and quantitative traits of birch (*Betula pendula*) pollen allergenic proteins in relation to the pollution contamination

Monika Ziemianin¹ · Jacek Waga² · Ewa Czarnobilska¹ · Dorota Myszkowska¹





Bet v6

Bet v7
Bet v1

Bet v2

Nr próbki KR-DA NI
Daszyńskiego Niepołomice
Bet v1 > 4 000 µg/mg pyłku Bet v1 > 200 µg/mg pyłku



Pacjent z alergią na brzozę w „czystym” lesie brzozowym ma lekki katar a pojedyncze pyłki brzozy w spalinach samochodowych powodują ostrą duszność (Astma sezonowa)

Lekki katar

Nasilony katar, zapalenie spojówek, duszność

KARTA WIZYT

Data wizyty: **2026-04-08**,

PACJENT **BW**, Wiek: **46**

Rozpoznanie:

J30.1 Uczuleniowe zapalenie błony śluzowej nosa spowodowane pyłkami kwiatowymi

J45.0 Astma alergiczna

Porada:

Od 2 lat wiosną katar, duszność

Dermatophagoides 7,47 kU/l ,

Brzoza 15,41 kU/l

Zakwalifikowany do SLIT Brzoza 100%

Leczenie objawowe: anty-histaminik,
GKS-donosowy, **wGKS + Formoterol**



Czy immunoterapia będzie skuteczna?

Urban Greening and Pollen Allergy: Balancing Health and Environmental Sustainability

Katarina Stevanovic ¹, Aki Sinkkonen ², Ruby Pawankar ³, Torsten Zuberbier ⁴



Kryteria wyboru roślinności miejskiej przyjaznej alergikom

Kryterium	Opis	Korzyści
Minimalizowanie roślin wiatropylnych	Unikanie roślin takich jak brzozy, trawy i cyprysy, które wytwarzają duże ilości pyłku	Zmniejsza alergię wywołane pyłkami i związane z nimi problemy zdrowotne
Promowanie wielogatunkowych wspólnot roślinnych	Unikanie sadzenia jednej odmiany rośliny w jednym obszarze zielonym, aby zapobiec koncentracji jednego rodzaju pyłku	Zwiększa bioróżnorodność i zapewnia usługi ekosystemowe, takie jak filtracja powietrza i wzbogacenie gleby, zmniejszając jednocześnie ilość pyłku jednego typu
Równoważenie proporcji płci roślin	Unikanie nadmiernego sadzenia roślin męskich, które uwalniają duże ilości pyłku („seksizm botaniczny”)	Pomaga kontrolować poziom pyłku i zapewnia zrównoważone funkcjonowanie ekosystemu
Wybór roślin odpornych na ciepło i niealergizujących	Stosowanie roślin odpornych na miejskie upały i niewydzielających alergizujących lotnych związków organicznych	Wspiera zrównoważony rozwój miast, ograniczając reakcje alergiczne
Włączanie elementów wzbogacających mikrobiotę	Projektowanie z użyciem mikrobiologicznie bogatych gleb i mikroorganizmów typowych dla środowisk wiejskich	Wzmacnia odporność i zmniejsza ryzyko astmy oraz alergii





► Front Immunol. 2025 Nov 19;16:1699886. doi: [10.3389/fimmu.2025.1699886](https://doi.org/10.3389/fimmu.2025.1699886)

Benzo[a]pyrene exacerbates allergen-induced airway inflammation through NLRP3-dependent dendritic cell activation and pathogenic T helper cell polarization

[Huamei Zou](#)^{1,2,*}, [Jiaqi Duan](#)^{1,2,*}, [Yongmin Xie](#)^{1,2}, [Ruifen Chen](#)^{1,2}, [Yanyu Ye](#)², [Aizhi Zhang](#)³, [Pingchang Yang](#)^{2,*}, [Gui Yang](#)^{1,*}, [Xiaoyu Liu](#)^{2,*}

Jak potwierdzić indywidualne narażenie na zanieczyszczenia powietrza ?

Badanie metabolitów benzo[a]pirenu (BaP) w moczu stanowi uznany biomonitoring narażenia na zanieczyszczenia powietrza, w tym na spaliny samochodowe, a najnowsza literatura silnie wiąże tę ekspozycję z zaostrzaniem reakcji alergicznych i astmy.


Benzo[a]pirenu (B(a)P) w powietrzu atmosferycznym charakteryzuje zanieczyszczenie **rakotwórczymi WWA** (Wielopierścieniowe Węglowodory Aromatyczne) powstają podczas niecałkowitego spalania i występują w postaci mieszanin pochodzących z **ogrzewania budynków mieszkalnych, ruchu drogowego, przemysłu, dymu tytoniowego** oraz przygotowywania żywności (spożywanie potraw grillowanych/wędzonych).



Article

The Influence of Air Pollution on the Development of Allergic Inflammation in the Airways in Krakow's Atopic and Non-Atopic Residents


Ewa Czarnobilska ¹, Małgorzata Bulanda ¹, Daniel Bulanda ² and Marcel Mazur ^{1,*}



Obecność 1-OHP w moczu u osób nienarażonych na dym tytoniowy jest potwierdzeniem narażenia środowiskowego na bechno(a)piren.

Uzyskaliśmy zależność między odległością od drogi a stężeniem 1-OHP w moczu.

W grupie osób z atopią uzyskano pozytywną korelację pomiędzy aktywacją bazofilów pyłem PM 2,5 i pyłkiem brzozy (BP) a 1-OHP.



1-hydroksypiren w moczu jako biomarker środowiskowego narażenia na wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA) w populacjach polskich na tle zanieczyszczenia powietrza

Annals of Agricultural
and Environmental Medicine

Urinary 1-hydroxypyrene as a biomarker of environmental PAH exposure in Polish populations against a background of air pollution

Michał Kuciel¹, Marcel Mazur^{2*}, Paweł Chwałuk³, Ewa Czarnobilska²

¹ Department of Toxicology Information and Laboratory Analysis, Department of Toxicology and Environmental Disease, Faculty of Medicine, Jagiellonian University, Jakubowskiego 2, 30-688 Kraków, Poland

² Department of Clinical and Environmental Allergology, Department of Toxicology and Environmental Disease, Faculty of Medicine, Jagiellonian University, Botaniczna 3, 31-503 Kraków, Poland

³ Regional Hospital Biała Podlaska, Terebelska 57-65, 21-500 Biała Podlaska, Poland

*Corresponding author: Marcel Mazur, marcel.mazur@uj.edu.pl

- Stężenie **1-hydroksypirenu (1-OH-P)** w moczu odzwierciedla niedawne **narażenie** wewnętrzne na **wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)**,
- stężenie **benzo[a]pirenu [B(α)P]** w powietrzu atmosferycznym służy do charakteryzowania **zanieczyszczenia rakotwórczymi WWA**.

Porównano stężenie 1-OH-P w moczu mieszkańców Krakowa i Białej Podlaskiej

w sezonie grzewczym i pozagrzewczym w 2021 r., odniesiono je do stężenia B(α)P

w pyle PM₁₀ oraz oceniono wyniki powtórnych pomiarów w Krakowie w 2025 r.



Stężenie benzo[a]pirenu (B(a)P) w powietrzu atmosferycznym stanowi wskaźnik zanieczyszczenia rakotwórczymi WWA.

Zmiany średniego stężenia benzo(a)pirenu (BaP) w PM10 w poszczególnych okresach pomiarowych


(2021-2022)




Stężenie 1-hydroksypirenu (1-OH-P) w moczu odzwierciedla niedawną wewnętrzną ekspozycję na wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA),

Zmiany średniego stężenia 1-OH-P/kreatynina w moczu w poszczególnych okresach pomiarowych (2021-2022)


Jednostka: $\mu\text{g/g}$ kreatyniny




Wśród uczestników z Białej Podlaskiej roczne stężenie 1-OH-P w moczu było wyższe u osób chodzących do pracy pieszo lub korzystających z komunikacji miejskiej niż u osób dojeżdżających samochodem



Porównano stężenia 1-OH-P w moczu u mieszkańców Krakowa w 2021 roku z 2025 rokiem



Wartości 1-OH-P w moczu dla Krakowa w 2025 roku były niższe niż w 2021 roku – zarówno w okresie grzewczym, jak i poza nim, a także w ujęciu rocznym dla poszczególnych uczestników.



Roczne stężenie B(a)P w środowisku w Krakowie spadło z 3860 do 1445 ng/m³.



Co może zrobić pacjent w dni ze złą jakością powietrza?

Interwencje o najwyższym stosunku korzyści do ryzyka

- Nie odstawiać leczenia kontrolującego; astma: leki zawierające ICS zgodnie z aktualnymi wytycznymi.
- Mieć pisemny plan działania: kiedy zwiększyć leczenie, kiedy pilnie szukać pomocy.
- W dni alertów ograniczyć intensywny wysiłek na zewnątrz i zmienić trasę z ruchliwej ulicy.
- Rozważyć filtr HEPA/oczyszczacz w domu, gdy indoor PM przekracza akceptowalne wartości lub ekspozycja jest nieunikniona.
- Maski filtrujące podczas krótkiej ekspozycji: szczególnie pacjenci z POChP/astmą ciężką.



Klucz: ochrona środowiskowa nie zastępuje leczenia - zmniejsza obciążenie wyzwalaczami.

Interwencje systemowe: leczenie populacyjne

profilaktyka publiczna

Największe korzyści zdrowotne daje redukcja emisji u źródła.

transport

strefy czystego transportu, mniej diesla, trasy szkolne poza arterią

ogrzewanie

wymiana źródeł spalania, termomodernizacja, kontrola jakości paliw

miasto

zieleń, wentylacja urbanistyczna

system ochrony zdrowia

ostrzeżenia, edukacja, integracja AQI z planami leczenia

Wytyczne EAACI formułują warunkowe rekomendacje dla ograniczania ekspozycji; GOLD rekomenduje systemy ostrzegania i działania public-health dla pacjentów z POChP.



Dziękuję za uwagę

Czyste powietrze to zdrowsze płuca – w Krakowie, Małopolsce i wszędzie.....

prof. dr hab. med. Ewa Czarnobilska

ewa.czarnobilska@uj.edu.pl

